



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

REGION MIDI-PYRENEES

ÉDITION GRANDES CULTURES

Ministère de l'Agriculture
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Rue Saint-Jean • BP 19 • 31131 BALMA CEDEX
Tél. 61. 24. 06. 51

Régisseur de Recettes
D.R.A.F. "MIDI-PYRÉNÉES"
CCP : 8618-62 Y Toulouse
I.S.S.N. : 0752-2053

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ABONNEMENT ANNUEL : 160 F.

BULLETIN N° 7 DU 11 AVRIL 1990

Conscients des dégâts occasionnés par les gelées et de vos grandes inquiétudes dues à la sécheresse, sachez que nous sommes sensibilisés à vos problèmes et que nous demeurons à votre service.

COLZA

Stade végétatif Les cultures sont actuellement au stade F2, pleine floraison.

CHARANCON DES SILIQUES

Situation Les captures en cuvette jaune ont légèrement progressé, notamment dans le Tarn.

Préconisation Intervenir dès que les dix premières siliques sont bien formées et que le seuil d'un charançon pour 2 plantes est observé.

Utiliser l'un des produits suivants :

- alphaséthane	FASTAC	0,2 l
- biphenthrine	TALSTAR	0,1 l
- bromophos	nombreuses spécialités	2 l
- cyfluthrine	BAYTHROID	0,2 l
- cyperméthrine	nombreuses spécialités	20 g de m.a.
- deltaméthrine	DECIS	0,2 l
- dialiphos	TORAK	1,25 l
- endosulfan	nombreuses spécialités	600 g de m.a.
- esfenvalérate	SUMI-ALPHA	0,6 l
- fenvalérate	SUMICIDIN	0,4 l
- lambda-cyhalothrine	KARATE	0,1 l
- phosalone	nombreuses spécialités	1200 g de m.a.
- tralométhrine	TRACKER 108 EC	0,065 l

CEREALES

Stades végétatifs Ils s'échelonnent de 6 à 10 pour les plus précoces.

MALADIES

Situation

- Sur blé, la rouille brune est fréquemment observée sur la F4 et débute sur la F3 (blés les plus précoces).
- Sur orge, la rouille naine et l'helminthosporiose sont observées.

Préconisation - Parcelles traitées selon les conseils de notre dernier bulletin n° 6 du 28 mars :

Attendre pour effectuer un nouveau traitement.

- Parcelles non encore traitées :

. sur blé, une intervention n'est à réaliser que dans les parcelles arrivées au stade 7 dans lesquelles on observe simultanément la présence d'oïdium virulent sur la base et de la rouille brune au niveau de la feuille n° 3.

Utiliser un produit polyvalent, efficace sur les deux maladies.

. sur orge ayant un bon potentiel de rendement, intervenir dans les mêmes conditions que pour le blé en choisissant un produit efficace sur rouille naine et helminthosporiose.

Pour les parcelles très touchées par la jaunisse nanifiante, attendre le début épiaison pour décider ou non d'une intervention.

Pour le choix des produits, se reporter au dépliant I.T.C.F.-S.P.V. "Protection des céréales".
Le conserver soigneusement. Il y sera fait référence dans nos prochains bulletins.

MAIS

Le dépliant ci-joint, "Protection du maïs", édité conjointement par l'A.G.P.M. et le SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX, indique les produits de lutte contre les mauvaises herbes et contre les ravageurs.

Conserver également ce dépliant. ■